


## COLIQUE NEPHRETIQUE

La colique néphrétique se manifeste par une douleur lombaire aiguë et unilatérale. Celle-ci peut irradier vers les organes génitaux. Elle est le plus souvent due à la présence d'un calcul dans l'un des 2 uretères.

Comment reconnaître les douleurs de colique néphrétique ?

La douleur de colique néphrétique est une douleur intense de la région lombaire et abdominale, survenant d'un seul côté. Elle est due à l'augmentation de la pression dans les voies urinaires et dans le rein. Cette augmentation de pression résulte de la présence d'un obstacle à l'écoulement des urines entre le rein et la vessie, cet obstacle étant le plus souvent un calcul.



La douleur est intense et apparaît de manière brutale. Elle est brève mais répétée, avec des périodes d'accalmie souvent incomplète. Une douleur sourde est souvent présente entre deux crises. Elle se manifeste d'un seul côté car l'obstacle est présent sur les voies urinaires droites ou gauches, naît dans le dos, et descend en revenant vers l'abdomen, l'aîne et les organes génitaux. Il n'y a souvent pas de position qui soulage la douleur.

Que faire en cas de colique néphrétique ?

- Prenez votre température pour vérifier que vous n'avez pas de fièvre (car une colique néphrétique avec de la fièvre pourra nécessiter un geste chirurgical dans certains cas)
- Prenez des antalgiques
- Consultez votre médecin traitant

Dans quels cas consulter un urologue en urgence ?

- Quand la crise s'accompagne de fièvre, de frissons, ou d'un mauvais état général.
- Si vous n'urinez pas depuis 24 heures
- Si la crise ne passe pas malgré le traitement
- Si vous n'avez qu'un seul rein.